

500mL


## オキシドール消毒用液「マルイシ」



キャップ：PP  
 ボトル：PE  
 ラベル：PET

A-1

使用后、フィルムをはがして  
 キャップをはずした後、空容器  
 を図のようにして折り目を外側  
 に押しつぶして下さい。  
 (つぶした後は元に戻りません。)



MARUSHI

開封日 年 月 日

500mL

外用殺菌消毒剤

オキシドール  
消毒用液「マルイシ」

Oxydol Disinfectant Solution [Marushi]

日本薬局方  
 オキシドール

製造番号

使用期限

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500mL

## オキシドール消毒用液「マルイシ」

*2016年 6月改訂(第3版) 2014年11月改訂	
日本標準商品分類番号	872614
承認番号	21900AMX01461
薬価収載	2007年12月
販売開始	2007年12月
再評価結果	1983年4月

貯法：避光し、30℃以下で保存。

使用期限：3年6ヵ月(表示の使用期限を参照すること。)

注意：〈配合禁忌〉酸化剤、還元剤、アルカリ性により分解する。

●禁忌(次の部位には使用しないこと)  
 瘻孔、挫創等本剤を使用した際に体腔にしみ込む  
 おそれのある部位  
 [空気塞栓を起こしたとの報告がある。]

## \*●組成・性状

## 1. 組成

過酸化水素 3%v/v6  
 及び添加物として水酢酸、アセトアニリド、エデ  
 酸ナトリウム水和物、エタノール 含有。

## 2. 性状

無色透明の液で、においはないか、又はオン  
 ようのにおいがある。  
 本品を放置するか、又は強く振り動かすとき、  
 徐々に分解する。  
 酸化剤又は還元剤と接触するとき、速やかに  
 分解する。  
 アルカリ性になると、激しく泡だつて分解する。  
 光によって変化する。  
 pH：3.0～5.0、比重  $d_{20}^{20}$ ：約1.01

500mL

## \*●効能・効果

創傷・潰瘍の殺菌・消毒  
 外耳・中耳の炎症、鼻炎、咽喉頭炎、扁桃炎などの  
 粘膜の炎症  
 口腔粘膜の消毒、齦窩及び根管の清掃・消毒、歯の  
 洗浄、口内炎の洗口

## \*●用法・用量

創傷・潰瘍：原液のままあるいは2～3倍希釈し  
 て塗布、洗浄する。

耳鼻咽喉：原液のまま塗布、滴下あるいは2～  
 10倍(耳科の場合、時にグリセリン、  
 アルコールで希釈する)希釈して洗  
 浄、噴霧、含嗽に用いる。

口 腔：口腔粘膜の消毒、齦窩及び根管の清  
 掃・消毒、歯の洗浄には原液又は2倍  
 希釈して洗浄・拭掃する。口内炎の洗  
 口には10倍希釈して洗口する。

## ●使用上の注意

- 重要な基本的注意  
 長期間又は広範囲に使用しないこと。
- 副作用  
 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確  
 となる調査を実施していない。  
 (1)重大な副作用  
 空気塞栓(頻度不明)：  
 空気塞栓を起こすことがあるので、循環動態  
 に異常を認めた場合など空気塞栓が疑われる  
 症状がみられた場合は、速やかに本剤の使用  
 を中止し、適切な処置を行うこと。  
 (2)その他の副作用  
 口腔(頻度不明)：  
 連用により口腔粘膜を刺激することがある。
- 適用上の注意  
 投与経路：外用にのみ使用し、内服しないこと。  
 使用時：  
 (1)眼に入らないよう注意すること。入った場合  
 には水でよく洗い流すこと。  
 (2)易刺激性の部位に使用する場合には、正常の  
 部位に使用する場合よりも低濃度とすること  
 が望ましい。  
 (3)深い創傷に使用する場合は希釈液としては  
 注射用蒸留水か滅菌精製水を用い、水道水や  
 精製水を用いないこと。
- その他の注意  
 長期大量経口投与によりマウスの十二指腸に  
 腫瘍の発生が認められたとの報告がある。