

500mL

口腔用剤

複方ヨード・グリセリン 「マルイシ」

Compound Iodine Glycerin 「Maruishi」

日本薬局方

複方ヨード・グリセリン

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500mL

複方ヨード・グリセリン「マルイシ」

2014年9月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	87279
承認番号	22000AMX00313
薬価収載	2008年6月
販売開始	2008年6月
再評価結果	1982年8月

貯法：遮光し、室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

- 禁忌(次の患者には使用しないこと)
本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

●組成・性状

1.組成

100mL中	ヨウ素	1.2g
	液状フェノール	0.5mL
	グリセリン	90mL

及び添加物としてハッカ水、ヨウ化カリウム 含有。

2.性状

赤褐色粘稠性の液で、特異なおいがある。
比重 d_{20}^{20} : 約1.23

●効能・効果

咽喉炎、喉頭炎、扁桃炎

●用法・用量

症状に応じ、適宜適量を患部に塗布する。

●使用上の注意

1.相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
水銀剤	ヨウ化水銀の毒性(腹痛、嘔吐、下痢、皮膚の炎症等)があらわれるおそれがある。	ヨウ化水銀を発生させるおそれがある。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用

アナフィラキシー様症状(呼吸困難、潮紅、蕁麻疹等)(頻度不明)が他のヨウ素製剤において、あらわれることがあるとの報告があるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

(2)その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹、口腔粘膜び爛等
甲状腺	血中甲状腺ホルモン値(T ₃ 、T ₄ 等)の上昇あるいは低下などの甲状腺機能異常

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3.妊婦、産婦、授乳婦等への投与

他のヨウ素製剤において、先天性甲状腺機能低下症の乳児の報告があるので妊娠中及び授乳中の婦人には、長期にわたる広範囲の使用をさけること。

製造番号

使用期限



キャップ:PP

ガラス:瓶



 (01)04987211251949



 (01)14987211151949