

警告



- ・引火性液体及び蒸気
- ・遺伝性疾患のおそれ
- ・呼吸器への刺激のおそれ及び眠気又はめまいのおそれ
- ・長期又は反復ばく露による臓器の障害
- ・強い眼刺激性
- ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

【使用上の注意事項】

- ・ご使用前に製品安全データシート(SDS)を参照すること。
- ・火気その他着火源(静電気を含む)から隔離すること。電気設備は防爆構造とし、静電気を発生させる恐れのある場所にはこれを除去する装置等を設けること。
- ・みだりに加熱、加減圧したり噴霧、蒸発させないこと。
- ・取扱う場合は、保護手袋、保護眼鏡等保護具を着用し、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意し、換気を充分行うこと。
- ・目、その他粘膜等に触れさせないこと。
- ・飲んではいけません。

【保管上の注意】

- ・保管は冷暗所に密栓保管し、幼児の手の届かないところに置き、転倒、落下、破損、漏洩のないようにすること。
- ・他の容器に移し替える場合は、専用の容器にその品名、注意事項等を明記すること。

【応急措置】

- ・初期火災の場合は、大量の水又はアルコール用消火器で消火すること。
- ・万一、目その他粘膜等に触れた場合は、大量の水で洗い流し、医師の手当を受けること。
- ・飲み込んだ場合は、水を飲ませて吐かせる等の処置をして医師の手当を受けること。
- ・吸入した場合は、空気の新鮮な場所に移し安静にする。ひどい場合は医師の手当を受けること。

開封日 年 月 日

ヨード脱色剤

ハイポアルコール

「マルイシ」

500mL

【成分・分量】

本品100mL中	
チオ硫酸ナトリウム	10g
エタノール	40mL
炭酸ナトリウム	微量
精製水	約57mL

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL. 0120-014-561

【用途】

希ヨードチンキ等ヨード製剤の使用により付着したヨード色の脱色用に、本品の適量を含ませた脱脂綿等でふきとるように用います。

【注意】

- 1.本品は寒冷時に混濁又は結晶の析出をみることがありますが、軽く加温して溶解しご使用下さい。
- 2.被服、家具等に用いるとき、その素材によっては脱色部が変質、変色することがありますので使用しないで下さい。



4

A-1

製造番号

使用期限