

500mL

殺菌消毒剤

劇 **フェノール「ニッコー」**
Phenol「NIKKO」

日本薬局方
劇 **フェノール**

98.0%
以上

うすめて使用

発売元
Ⓔ **丸石製薬株式会社**
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

500mL

劇 **フェノール「ニッコー」**

劇薬

2015年1月改訂(第2版)	
日本標準品分類番号	872619-877322
承認番号	16100AMZ01313
薬価収載	1986年3月
販売開始	1991年7月
再評価結果	1992年8月

貯 法：遮光し、室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●禁忌(次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜[吸収され中毒症状を起こすおそれがある。]

●組成・性状

- 1.組成
本品1mL中 日局フェノール1mL 含有。
- 2.性状
無色～わずかに赤色の結晶又は結晶性の塊で、特異なにおいがある。
エタノール(95)、又はジエチルエーテルに極めて溶けやすく、水にやや溶けやすい。
本品10gに水1mLを加えるととき、液状となる。
光又は空気によって徐々に赤色を暗赤色となる。
皮膚を侵して白くする。
凝固点：約40℃

●効能・効果 ●用法・用量

効能・効果	用法・用量(本品希釈倍率)
手指・皮膚の消毒	フェノールとして1.5～2%溶液を用いる。(50～67倍)
医療機器・手術室・病室・家具・器具・物袋などの消毒	フェノールとして2～5%溶液を用いる。(20～50倍)
排泄物の消毒	フェノールとして3～5%溶液を用いる。(20～33倍)
下記疾患の鎮痒 痒疹(小児ストロファルスを含む)、 じん麻疹、虫さされ	液：フェノールとして1～2%溶液を用いる。(50～100倍) 軟膏：フェノールとして2～5%軟膏を用いる。(20～50倍)

●使用上の注意

- 1.重要な基本的注意
- 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合には腐蝕及び吸収され、中毒症状を起こすことがあるので、直ちに拭きとりエタノール又は多量の水でよく洗い流すこと。
 - 眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
 - 本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
 - 炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には、濃度に注意して正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
- 2.副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
- その他の副作用
過敏症：発疹等(頻度不明)の過敏症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。
- 3.適用上の注意
- 人体
投与経路：外用にのみ使用すること。
使用時：
ア.密封包帯、ギプス包帯、パックに使用すると刺激症状及び吸収され、中毒症状があらわれるおそれがあるので、使用しないこと。
イ.長期間又は広範囲に使用しないこと。[吸収され、中毒症状を起こすおそれがある。]
ウ.誤飲を避けるため、保管及び取扱には十分注意すること。
 - その他
ア.金属器具を長時間浸漬する必要がある場合は、腐蝕を防止するために0.5～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
イ.合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗料カラーアール等には変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- 薬効薬理
本剤は、使用濃度においてグラム陽性菌、グラム陰性菌、結核菌には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び大部分のウイルスに対する効果は期待できない。

製造番号

使用期限

