

500mL

外用殺菌消毒剤

希ヨードチンキ「マルイシ」

Dilute Iodine Tincture 「Maruishi」

日本薬局方

希ヨードチンキ

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

希ヨードチンキ「マルイシ」

500mL

2014年9月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872612
承認番号	16100AMZ01027
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1983年4月

貯法: 室温保存。

使用期限: 3年(表示の使用期限を参照すること。)

注意: &lt;配合変化&gt; マーキュロクロム液とは沈殿を生じる。

●禁忌(次の患者には使用しないこと)  
ヨード過敏症の患者

## ●組成・性状

## 1. 組成

100mL中 ヨウ素 3g  
及び添加物としてヨウ化カリウム、エタノール 含有。

## 2. 性状

暗赤褐色の液で、特異なにおいがある。  
比重  $d_{20}^{20}$ : 約0.93

## ●効能・効果

皮膚表面の一般消毒、創傷・潰瘍の殺菌・消毒、歯肉及び  
口腔粘膜の消毒、根管の消毒

## ●用法・用量

本剤をそのまま、又は2~5倍に希釈し、1日2~3回患部及  
び皮膚に適量塗布する。

## ●使用上の注意

## 1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる  
調査を実施していない。

	頻度不明	0.1%未満
過敏症 <sup>注)</sup>		ヨード疹等
皮膚 <sup>注)</sup>	刺激症状	

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

## 2. 臨床検査結果に及ぼす影響

血漿たん白結合ヨード(PBI)及び甲状腺放射性ヨード  
摂取率の検査値に影響を及ぼすことがある。

## 3. 適用上の注意

投与経路: 外用にのみ使用し、内服しないこと。

使用時:

- (1)眼に入らないよう注意すること。入った場合には水  
でよく洗い流すこと。
- (2)粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使  
用しないこと。
- (3)深い創傷に使用する場合は希釈液としては注射用  
蒸留水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用い  
ないこと。
- (4)同一部位に反復使用した場合には、表皮の剥離を  
伴う急性の皮膚炎を起こすことがあるので注意す  
ること。
- (5)口腔内に使用するときは、患部を乾燥させて塗布  
すること。
- (6)本剤は引火性、爆発性があるため、火気には十分  
注意すること。

製造番号

使用期限

キャップ: PP  
ガラス: 瓶

↑バーコード用単位包装剤包  
↓



(01)04987211222130

↑バーコード用単位包装剤包  
↓



(01)14987211222130