


開封済

10mL×10シリンジ

劇 塩酸メピバカイン注射液2%〔NP〕

200mg/10mL



高压蒸気滅菌済み

プリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

1シリンジ(10mL)中、メピバカイン塩酸塩200mgを含有する。
注意-医師等の処方箋により使用すること
貯法：室温保存
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

発売
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

NIPRO

製造販売 ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

2%




10mL×10シリンジ
局所麻酔剤

劇 塩酸メピバカイン注射液2%〔NP〕

MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION SYRINGE

200mg/10mL



高压蒸気滅菌済み

プリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

2%

10mL×10シリンジ

2%

劇 塩酸メピバカイン注射液2%〔NP〕

含 量	200mg
包 装	10mL×10シリンジ
貯 法	室温保存
規制区分	劇 要処方
製造番号	
使用期限	

10mL×10シリンジ

劇 塩酸メピバカイン注射液2%〔NP〕

MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION SYRINGE

【取扱い上の注意】

1. プリスター包装は使用直前まで開封しないこと。使用に際しては、開封口からゆっくり開けること。
2. シリンジが破損するおそれがあるため、強い衝撃を避けること。
3. プリスター包装から取り出す際、プランジャーを持って引き出さないこと。[ガasketが変形し、プランジャーが外れたり、薬液が漏出するおそれがある。]
4. 薬液が漏れている場合や、薬液に混濁や浮遊物等の異常が認められるときは使用しないこと。
5. シリンジに破損等の異常が認められるときは使用しないこと。
6. シリンジ先端のキャップを外した後、シリンジ先端部に触れないこと。
7. 開封後の使用は一回限りとし、使用後の残液は容器とともに速やかに廃棄すること。
8. シリンジの再滅菌・再使用はしないこと。
9. 注射針等を接続する場合は誤刺に注意し、しっかりと固定すること。

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が起こった場合は、ただちに人工呼吸、酸素吸入等を実施すること。

2%