

イオウカンフルローションを使用されている方へ

イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

1 必ず冷蔵庫に入れて保管してください。



色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。

2 洗顔後、手をきれいに洗います。



スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。

4 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。



容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。

3 **朝** 透明のうわずみを使います。 **晩** よく振って、まぜてから使います。



5 患部にやさしく塗布してください。



刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

丸石製薬株式会社

ツール：108770
201508

イオウカンフルローションを使用されている方へ

イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

1 必ず冷蔵庫に入れて保管してください。



色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。

2 洗顔後、手をきれいに洗います。



スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。

4 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。



容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。

3 **朝** 透明のうわずみを使います。 **晩** よく振って、まぜてから使います。



5 患部にやさしく塗布してください。



刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

丸石製薬株式会社

ツール：108770
201508

イオウカンフルローションを使用されている方へ

イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

1 必ず冷蔵庫に入れて保管してください。



色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。

2 洗顔後、手をきれいに洗います。



スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。

4 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。



容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。

3 **朝** 透明のうわずみを使います。 **晩** よく振って、まぜてから使います。



5 患部にやさしく塗布してください。



刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

丸石製薬株式会社

ツール：108770
201508

イオウカンフルローションを使用されている方へ

イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

1 必ず冷蔵庫に入れて保管してください。



色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。

2 洗顔後、手をきれいに洗います。



スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。

4 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。



容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。

3 **朝** 透明のうわずみを使います。 **晩** よく振って、まぜてから使います。



5 患部にやさしく塗布してください。



刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

丸石製薬株式会社

ツール：108770
201508