

使用量
目安

—

—

100

—

—

—

—

200

—

—

—

—

—

300

—

—

開封日 年 月 日 とりかえの目安 年 月 日

第2類医薬品

泡の速乾性手指消毒剤

飲みません

火気注意



残量
目安

—

開封日

300

—

年

—

200

月

—

日

—

100

—

—

—

—

販売名：ウエルフォーム

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。

△使用上の注意

△してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
手指の皮膚の治療を受けている人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

△相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

●効能・効果

手指の消毒

●用法・用量

そのまま手指に塗布又は塗擦

△用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。
- (5) やけどのような痛みを伴う炎症をおこすことがあるので、溶液の状態では長時間皮膚と接触させないこと。

●成分・分量

本剤100mL中 クロロヘキシジメチルグルコン酸塩 0.2g
及び添加物としてポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、グリチルリチン酸、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリジンカルボン酸塩、トコフェロール酢酸エステル、エタノール 含有。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に、保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため床にごぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- (6) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- (7) 使用時は、ストッパーを外すこと。

【お問合せ先】

丸石製薬株式会社
学術情報グループ
大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL. 0120-014-561

副作用被害救済制度

☎0120-149-931(フリーダイヤル)

火気注意

(エタノール含有)



ポンプ：PP、PE
ボトル：PE
ストッパー：PE
ラベル：PET

A-1



製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

